

お腹の症状
放置していませんか？



内視鏡検査のご案内

診療時間

診療時間	月	火	水	木	金	土	日/祝
8:30-12:00	○	○	○	○	○	★	-
15:00-18:00	○	○	○	○	○	-	-

★土曜日 8:30-13:30 [完全予約制]

アクセス



[国道21号からお越しの場合]
岐阜方面からは三宅IC下車 / 各務原方面からは長森南IC下車



KEYAKI CLINIC

けやきクリニック

〒501-6003 岐阜県羽島郡岐南町平島5丁目118番地

TEL.058-213-3310



KEYAKI CLINIC

けやきクリニック

内視鏡検査を安心して 受けていただくために

POINT. 01

**内視鏡専門医による
苦痛の少ない検査を行います。**

経験の多い内視鏡専門医3名が検査させていただきます。
苦痛の少ない検査できちんと診断・治療を行います。



POINT. 02

**検査の結果は
複数の専門医で検討・確認をします。**

内視鏡所見は複数の専門医で確認し、
症例の検討を行います。



POINT. 03

**検査の介助は消化器内視鏡技師の
資格を有したスタッフが対応します。**

当院は消化器内視鏡技師の資格を有したスタッフが
複数名常在しております。内視鏡検査の介助経験が豊富であり
安心して検査が受けられるようにサポートします。



POINT. 04

鎮静剤を使用した検査ができます。

胃カメラ、大腸カメラともに静脈麻酔を使用し寝ている間に
検査を受けていただくことができます。

(安全面から鎮静剤使用当日は運転を控えていただくようお願いしております)



POINT. 05

平日午後や土日も検査ができます。

早期診断・治療のために早めの検査をおすすめしています。

スタッフ紹介



SHUN ITO

医師
伊藤 隼

「病」と対峙し、
「人」を診る。

資格

- 消化器内視鏡学会 内視鏡専門医
- 消化器病学会専門医




TAKAYUKI YUMURA

医師
湯村 崇之

丁寧かつ苦痛の少ない
検査を提供します。

資格

- 消化器内視鏡学会 内視鏡専門医
- 消化器病学会専門医
- 消化器がん検診学会総合認定医



TAKASHI SHIBUYA

医師
澁谷 高志

お腹の症状で
お困りの方はお気軽に
ご相談ください。

資格

- 消化器内視鏡学会 内視鏡専門医
- 消化器病学会専門医

介助スタッフ


消化器内視鏡技師の資格を有したスタッフが複数名常勤しております。

内視鏡検査に対して
「怖い」、「辛い」というイメージを
抱かれている方が多いと思います。
そんな不安や恐怖心を少しでも
取り除くことができるように、
私達が全力でサポートします。





上部消化管内視鏡検査 [胃カメラ]



- 腹痛 胃痛 胸やけ 胃もたれ感 胸のつかえ感
- 嘔吐 吐血 吐き気 食欲低下 家系に胃がんの方がいる
- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍になったことがある 胃がんの治療を受けたことがある
- ピロリ菌を指摘されたことがある 検診(バリウムや胃カメラ)で異常を指摘されたことがある

このような病気の可能性があります

逆流性食道炎、胃・十二指腸潰瘍、慢性胃炎、ピロリ菌感染、各種ポリープ、各種がん、機能性ディスペプシアなど

内視鏡検査で早期診断・治療を

検査当日のながれ



問診

検査前の食事状況を確認します(前日夜9時からは絶食にしてください必要があります)。鎮静剤を使われる方は送迎の有無を確認します。事前に記載頂いた問診票の確認を行います。



鼻麻酔

内視鏡がスムーズに鼻を通るように鼻・咽喉頭の粘膜に麻酔をします。当院はスライドスティック式鼻麻酔法を採用しております。
※鎮静剤を使用した検査も可能です。
※希望に合わせ経口での内視鏡検査も対応できます。



検査

検査は5-10分程度で終了します。経鼻内視鏡の場合は検査中の会話も可能です。病変を認める場合は希望に合わせて病理検査を行います。



診察

検査後、内視鏡画像を供覧しながら主治医より結果の説明を行います。病理検査を行った場合は後日の結果説明が必要になります(通常10日後かかります)。

当院の特徴

POINT. 01


鼻から胃カメラ検査ができます。(経鼻内視鏡検査)

経鼻内視鏡(鼻からの胃カメラ)は従来の経口内視鏡と比べ内視鏡経が細く、鼻からスコープを挿入するので舌の根元を刺激することがなく嘔吐反射のでにくい検査です。
※口からの検査も選択可能です。



口からの胃カメラ

スコープが舌の付け根や喉に触れると吐き気などを感ずります。



鼻からの胃カメラ

スコープが舌の付け根に触れないため吐き気などが軽減されます。

苦痛の少ない鼻麻酔スライドスティック鼻麻酔法

当院は鼻の麻酔方法に特徴があります。

「経鼻内視鏡は楽だと聞いて受けてみたところ苦しかった」という患者さんがときにおられます。このような方の中には鼻の麻酔が不十分であったために検査で辛い思いをされている場合があります。

鼻の麻酔が正しく行われていない場合や不十分な場合は、痛いだけでなく吐き気や嘔吐反射が多く出ることがわかっています。

当院ではスライドスティック鼻麻酔法を行っております。

これは長年経鼻内視鏡の開発に従事してきた森昭裕医師(一宮西病院)が開発した方法です。

(日本消化器がん検診学会雑誌 2015.Mar.Vol53)

症状に応じて当日の検査も対応します。

POINT. 02

症状から主治医が当日の検査が望ましいと判断した場合、受診当日に検査を行う場合があります。(ただし直前の食事状況などによっては不可能な場合があります。)



鎮静剤を使用し寝ている間の検査が可能です。


POINT. 03

静脈麻酔(点滴からの麻酔)を使用し寝ている間に検査を受けていただけます。安全面から鎮静剤を使用した場合、当日の運転は控えていただくよう御案内しております。



下部消化管内視鏡検査 [大腸カメラ]

このような症状を
放置していませんか？



- 腹痛 便秘 下痢 体重減少 お腹の張り 便が細い 血便
- 大腸がん・ポリープの治療を受けたことがある 家系に大腸がんの方がいる
- 40歳を超えているが検査を受けたことがない 検診の便潜血で陽性になった

このような病気の可能性があります

便通異常、各種ポリープ、大腸がん、
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎 クローン病)、過敏性腸症候群、痔疾患など

内視鏡検査で早期診断・治療を

検査当日のながれ(当院で前処置を行う場合)



問診

前日の下剤の服用状況を確認します。
鎮静剤を使われる方は送迎の有無を確認します。
事前に記載頂いた問診票の確認を行います。




腸管洗浄液(下剤)

3種類の腸管洗浄液から患者様に合わせたものを選択します。
※腸管洗浄液は「ご自宅で服用する方法」と「クリニックで服用する方法」をお選びいただけます。



検査

通常10-15分程度で終了します。同日のポリープ切除も可能です。
※鎮静剤を使用した検査も可能です。



診察

検査後診察室で結果を説明します。
病理検査を施行した場合は後日の結果説明が必要になります(通常10日前後かかります)。

当院の特徴

POINT.
01

拡大内視鏡、
画像強調内視鏡を使用し、
より詳細に病変を評価します。

当院は富士フィルム社製の内視鏡を導入。
通常観察に加え
拡大内視鏡・画像強調内視鏡画像が
撮影可能であり病変のより詳細な評価が
可能になります。



炭酸ガスを使用した送気システムを
採用しているため検査後の
お腹の張りが軽減されます。

POINT.
02

当院は大腸内視鏡検査時の
送気システムに炭酸ガスを使用しております。
炭酸ガスは自然に吸収されるため
検査後のお腹の張りが少なくなります。



POINT.
03

前処置室、
専用の控室(トイレ隣接)、
リカバリールームを
完備しています。

POINT.
04

検査当日の
ポリープ切除ができます。

主治医によって切除可能と判断される場合、
ポリープは検査当日に切除可能です(日帰り治療)。

POINT.
05

鎮静剤を使用し寝ている間の検査が可能です。

静脈麻酔(点滴からの麻酔)を使用し寝ている間に検査を受けていただけます。
安全面から鎮静剤を使用した場合、当日の運転は控えていただくよう御案内しております。